

DOAC（経口直接Xa阻害薬） フォーミュラ ver.1.0

2025年4月作成

白十字病院

薬剤部・脳血管内科・心臓血管内科・薬事委員会

	薬剤名（院内採用薬のみ）	用法・1日薬価	備考
推奨薬	リバーロキサバンOD錠10mg/15mg （先発：イグザレルト）	1日1回 10mg：161.3円 15mg：226.7円	腎機能(Ccr)で用量調節
オプション	リクシアナOD錠15mg/60mg （一般名：エドキサバン）	1日1回 15mg：224.7円 60mg：416.8円	腎機能(Ccr)・体重・併用薬などで用量調節
	エリキュース錠2.5mg/5mg （一般名：アピキサバン）	1日2回 2.5mg：117.5×2=235円 5mg：212.3×2=424.6円	腎機能(Cr)・体重・年齢などで用量調節

【不整脈薬物治療ガイドラインより抜粋】

詳細は各ガイドラインをご参照ください

心房細動に対する抗凝固療法

- 出血リスクの高い患者に対しては、大規模臨床試験において大出血発生率が低いDOAC（アピキサバン、ダビガトラン、エドキサバン）を用いる

【JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版 不整脈治療より抜粋】

抗凝固療法高リスクの高齢心房細動患者（超高齢者出血リスク）

- 承認用量での抗凝固薬投与が困難な超高齢抗出血リスク患者に対しては、エドキサバン15mgを投与する