

|    |                      |
|----|----------------------|
| 胃癌 | SP3 療法(ショートハイドレーション) |
|----|----------------------|

レジメン概要

|            |  |
|------------|--|
| 抗がん剤 [投与量] | ① シスプラチン静注用(シスプラチン) [60mg/m <sup>2</sup> ] Day1<br>② エスワンタイホウ配合 OD 錠(テガフル・キメラシル・オテラシル) [80mg/m <sup>2</sup> /day(分 2)] |
| 催吐性リスク     | 高度   |
| 1 コース期間    | 21 日間  |

投与スケジュール

| Rp | 薬剤名                            | 用量     | 投与法 | 時間     | Day |   |   |   |   |    |  |
|----|--------------------------------|--------|-----|--------|-----|---|---|---|---|----|--|
|    |                                |        |     |        | 1   | . | . | . | . | 21 |  |
| 1  | 生食 500ml                       | 1 袋    | DIV | ルートキープ | ●   |   |   |   |   |    |  |
| 2  | 生食 500ml                       | 1 袋    | DIV | 60 分   | ●   |   |   |   |   |    |  |
|    | アスパラギン酸 K 注 10mEq              | 1 筒    |     |        |     |   |   |   |   |    |  |
|    | 硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL<br>(20mEq/A) | 0.4 管  |     |        |     |   |   |   |   |    |  |
| 3  | マンニトール注射液 300ml                | 1 袋    | DIV | 60 分   | ●   |   |   |   |   |    |  |
| 4  | 生食 500mL                       | 1 袋    | DIV | 120 分  | ●   |   |   |   |   |    |  |
|    | シスプラチン                         | [上記参照] |     |        |     |   |   |   |   |    |  |
| 6  | 生食 500mL                       | 1 袋    | DIV | 60 分   | ●   |   |   |   |   |    |  |

|  |
|--|
| <p>【備考】</p> <p>エスワンタイホウ配合 OD 錠は 2 週間服用し 1 週間休薬</p> <p>Day1 にシスプラチン投与</p> |
|--|