


脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 大森 睦子

70歳以上の受傷機転は**転倒が一番多い**です！



Japan Trauma Data Bank Report 2014-2018

Figure 6 受傷機転別患者数の年齢分布



© Japan Trauma Care and Research 2019. All Rights Reserved Worldwide

転倒リスク要因

抗血栓薬服用者は多い

加齢

- ・サルコペニア(筋力低下)
- ・フレイル(虚弱)

抗血小板薬

- ・バイアスピリン®
- ・シロスタゾール
- ・クロピドグレル
- ・エフィエント®

病気

- ・不整脈 ・脳卒中
- ・緑内障・変形性膝関節症

抗凝固薬

ワーファリン

- ・ワーファリン®

薬

- ・睡眠導入剤 ・利尿剤
- ・鎮痛剤(一部) ・多剤併用

抗凝固薬

DOAC

- ・プラザキサ® ・イグザレルト®
- ・エリキュース® ・リクシアナ®

※抗血栓薬は、カルテ上緑で表記

特に抗血栓薬服用者は...

頭部外傷では重大な脳損傷を招く場合もあります

転倒転落のプロトコールに沿って検査を行いましょう

頭部外傷は、数分～数時間で状態が変化します

外傷後**24時間**は、観察強化しましょう

(V.S異常・意識レベル低下(せん妄)・嘔吐・痙攣・頭痛・麻痺の有無)