

胆道癌	キイトルーダ+GC 療法(ショートハイドレーション)
-----	----------------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	① キイトルーダ点滴静注(ヘムフロリスマブ) [200mg/body] Day1 ② シスプラチン静注用(シスプラチン) [25mg/m ²] Day1.8 ③ ゲムシタビン点滴静注液(ゲムシタビン) [1000mg/m ²] Day1.8
催吐性リスク	中等度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day			
					1	8	15	21
1	生食 500ml	1 袋	DIV	ルートキープ	●	●		
2	生食 100ml キイトルーダ点滴静注	1 瓶 [上記参照]	DIV	30 分	●			
3	生食 500ml アスパラギン酸 K 注 10mEq 硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL (20mEq/A)	1 袋 1 筒 0.4 管	DIV	60 分	●	●		
4	マンニトール注射液 300ml	1 袋	DIV	60 分	●	●		
5	生食 500mL シスプラチン	1 袋 [上記参照]	DIV	90 分	●	●		
6	生食 100mL ゲムシタビン点滴静注液 ※	1 瓶 [上記参照]	DIV	30 分	●	●		
7	生食 500mL	1 袋	DIV	60 分	●	●		

【備考】